


Entrevista para as perturbações de ansiedade e perturbações relacionadas do DSM-5 (ADIS-5)

A ADIS-5 é uma entrevista diagnóstica semiestruturada de referência, utilizada por psicólogos e outros clínicos para avaliar as perturbações de ansiedade e as perturbações relacionadas segundo os critérios do DSM-5. Permite uma exploração aprofundada dos sintomas, do diagnóstico diferencial, das comorbilidades, do evitamento, do sofrimento subjetivo e do impacto funcional. Amplamente utilizada na prática clínica especializada e na investigação, ajuda a estabelecer diagnósticos fiáveis, a hierarquizar os problemas clínicos e a orientar as decisões terapêuticas. A sua estrutura modular permite adaptar a aplicação aos sintomas presentes, o que faz dela um instrumento particularmente relevante para a avaliação abrangente das perturbações de ansiedade no adulto.

Número de perguntas	120 perguntas
Duração estimada	90 minutos
Idioma	Português
Nome original	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Público-alvo	Adultos
Autores	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Categoria	Ansiedade

Pré-visualização das 120 perguntas

Secção da perturbação de pânico:

Preocupação com futuros ataques

0 - Nenhum | 1 | 2 - Ligeiro | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muito grave

Secção da perturbação de pânico:

Evitamento situacional

0 - Nenhum | 1 | 2 - Ligeiro | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muito grave

Secção da perturbação de pânico:

Sensibilidade/evitamento interocetivo

0 - Nenhum | 1 | 2 - Ligeiro | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muito grave

Secção da perturbação de pânico:

Sinais de segurança

0 - Nenhum | 1 | 2 - Ligeiro | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muito grave

Secção da perturbação de pânico:

Distração

0 - Nenhum | 1 | 2 - Ligeiro | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muito grave

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

Cotação e interpretação

O clínico conduz uma entrevista semiestruturada, verifica os critérios diagnósticos do DSM-5 para cada perturbação explorada e atribui uma cotação de gravidade pelo clínico (CSR) de 0 a 8. Uma CSR de 4 ou mais é geralmente considerada indicativa de uma perturbação clinicamente significativa. A interpretação baseia-se na presença dos critérios, na intensidade dos sintomas, na cronicidade, no evitamento, no prejuízo funcional e nas comorbilidades. O número de perguntas varia consoante os módulos aplicados.

Utilização

Este instrumento não está disponível no Mentaal. Para utilizar este questionário na sua prática, tem de dispor de uma licença de utilização válida. Convidamo-lo a enviá-lo diretamente a partir do site do editor.

Aceder ao site do editor ›

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente

Ver todos os questionários

★★★★★

“Ao início estava cética, mas hoje já não consigo dispensar esta ferramenta na minha prática.”

Elodie C. - Psicóloga (TCC)