BPDSI

Índice de gravidade da perturbação da personalidade borderline (BPDSI)

O BPDSI é uma entrevista semiestruturada concebida para avaliar a gravidade dos sintomas da perturbação da personalidade borderline nos últimos três meses. Proporciona uma medida quantitativa das principais manifestações clínicas da perturbação segundo os critérios do DSM, facilitando o acompanhamento da evolução dos sintomas e a avaliação da eficácia do tratamento.

Número de perguntas	70 perguntas
Duração estimada	40 minutos
Idioma	Português
Nome original	Borderline Personality Disorder Severity Index
Público-alvo	Adultos com suspeita de perturbação da personalidade borderline
Autores	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Categoria	Perturbações da personalidade

Pré-visualização das 70 perguntas

Nos últimos três meses, alguma vez ficou desesperado/a quando pensou que alguém de quem gosta o/a ia abandonar?

Para cotar positivo, são necessários exemplos claros.

0 - Nunca | 1 - 1 vez em 3 meses | 2 - 2 vezes em 3 meses | 3 - 3 vezes em 3 meses / 1 vez por mês | 4 - 4 a 5 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 3 semanas | 5 - 6 a 7 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 2 semanas | 6 - 8 a 10 vezes em 3 meses / 2 vezes em cada 3 semanas | 7 - 1 vez por semana / 11 a 15 vezes em 3 meses | 8 - Várias vezes por semana, mas menos de metade da semana | 9 - Mais de metade da semana / quase diariamente | 10 - Diariamente

Nos últimos três meses, tentou de forma obsessiva manter junto de si alguém importante para si que o/a queria evitar (ou que pensava que o/a queria evitar)?

Por exemplo, telefonar continuamente, controlar, seduzir... Só se cotam formas exageradas, forçadas e frenéticas. Este item diz respeito a abandono real e imaginado; para cotar positivo, são necessários exemplos claros de tentativas.

0 - Nunca | 1 - 1 vez em 3 meses | 2 - 2 vezes em 3 meses | 3 - 3 vezes em 3 meses / 1 vez por mês | 4 - 4 a 5 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 3 semanas | 5 - 6 a 7 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 2 semanas | 6 - 8 a 10 vezes em 3 meses / 2 vezes em cada 3 semanas | 7 - 1 vez por semana / 11 a 15 vezes em 3 meses | 8 - Várias vezes por semana, mas menos de metade da semana | 9 - Mais de metade da semana / quase diariamente | 10 - Diariamente

Nos últimos três meses, alguma vez implorou ou chorou para que alguém não o/a deixasse?

0 - Nunca | 1 - 1 vez em 3 meses | 2 - 2 vezes em 3 meses | 3 - 3 vezes em 3 meses / 1 vez por mês | 4 - 4 a 5 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 3 semanas | 5 - 6 a 7 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 2 semanas | 6 - 8 a 10 vezes em 3 meses / 2 vezes em cada 3 semanas | 7 - 1 vez por semana / 11 a 15 vezes em 3 meses | 8 - Várias vezes por semana, mas menos de metade da semana | 9 - Mais de metade da semana / quase diariamente | 10 - Diariamente

Nos últimos três meses, alguma vez ameaçou fazer alguma coisa para garantir que alguém não o/a deixava?

Por exemplo, chantagem, mentiras, homicídio, suicídio.

0 - Nunca | 1 - 1 vez em 3 meses | 2 - 2 vezes em 3 meses | 3 - 3 vezes em 3 meses / 1 vez por mês | 4 - 4 a 5 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 3 semanas | 5 - 6 a 7 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 2 semanas | 6 - 8 a 10 vezes em 3 meses / 2 vezes em cada 3 semanas | 7 - 1 vez por semana / 11 a 15 vezes em 3 meses | 8 - Várias vezes por semana, mas menos de metade da semana | 9 - Mais de metade da semana / quase diariamente | 10 - Diariamente

Nos últimos três meses, alguma vez tentou impedir fisicamente que alguém o/a deixasse?

Por exemplo, pondo-se à frente de uma porta, agarrando-se a alguém.

0 - Nunca | 1 - 1 vez em 3 meses | 2 - 2 vezes em 3 meses | 3 - 3 vezes em 3 meses / 1 vez por mês | 4 - 4 a 5 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 3 semanas | 5 - 6 a 7 vezes em 3 meses / 1 vez em cada 2 semanas | 6 - 8 a 10 vezes em 3 meses / 2 vezes em cada 3 semanas | 7 - 1 vez por semana / 11 a 15 vezes em 3 meses | 8 - Várias vezes por semana, mas menos de metade da semana | 9 - Mais de metade da semana / quase diariamente | 10 - Diariamente

Cotação e interpretação

Cada item é cotado numa escala de frequência de 0 (nunca) a 10 (diariamente ou constantemente presente). As pontuações de cada critério do DSM são somadas para obter uma pontuação total que indica a gravidade global da perturbação. Estão também disponíveis pontuações por dimensão.