

Escalas de avaliação da PHDA no adulto de Conners (CAARS-2)

A CAARS-2 é um instrumento de avaliação padronizado concebido para medir os sintomas de PHDA em adultos segundo os critérios do DSM-5. Inclui questionários de autorresposta e de heteroavaliação por um observador, disponíveis em formato breve ou completo, que permitem um rastreio rápido ou uma análise aprofundada. O teste fornece pontuações referenciadas a normas, ajuda a identificar perfis clínicos e inclui índices de validade que reforçam a interpretação. Integra-se facilmente num processo de avaliação clínica ou de acompanhamento psicoterapêutico.

Número de perguntas	66 perguntas
Duração estimada	30 minutos
Idioma	Português
Nome original	Conners' Adult ADHD Rating Scales
Público-alvo	Adultos
Autores	C. Keith Conners, David Erhardt, Elizabeth Sparrow (1999)
Categoria	PHDA

Pré-visualização das 66 perguntas

Gosto de fazer atividades e de me manter ativo/a.

Nunca | Às vezes | Frequentemente | Muito frequentemente

Perco objetos de que preciso para as minhas atividades (chaves, papéis, canetas, etc.).

Nunca | Às vezes | Frequentemente | Muito frequentemente

Tenho dificuldade em planear com antecedência.

Nunca | Às vezes | Frequentemente | Muito frequentemente

Falo ou respondo depressa demais, sem pensar.

Nunca | Às vezes | Frequentemente | Muito frequentemente

Corro muitas vezes riscos ou meto-me em situações perigosas.

Nunca | Às vezes | Frequentemente | Muito frequentemente

Cotação e interpretação

Cada item é cotado numa escala de Likert. As pontuações são interpretadas com base em normas da população adulta, e as subescalas ajudam a avaliar as diferentes facetas da PHDA: hiperatividade, impulsividade, problemas de atenção, etc.

Utilização

Este instrumento não está disponível no Mentaal. Para utilizar este questionário na sua prática, tem de dispor de uma licença de utilização válida. Convidamo-lo a enviá-lo diretamente a partir do site do editor.

Aceder ao site do editor