
Lista de avaliação da PHDA da CADDRA (CADDRA)



A Lista de avaliação da PHDA da CADDRA é um instrumento clínico para identificar a perturbação de hiperatividade/défice de atenção (PHDA) e estruturar a sua avaliação. Utilizada no âmbito das diretrizes canadianas, ajuda o psicólogo ou o clínico a rever os sintomas nucleares da PHDA segundo os critérios diagnósticos atuais, bem como o seu impacto funcional em diferentes contextos de vida. O instrumento insere-se numa abordagem multimodal que inclui a entrevista clínica, a história do desenvolvimento, o rastreio de comorbilidades e, se possível, informações de familiares, professores ou outros profissionais. É particularmente útil para padronizar o exame dos sintomas de desatenção e de hiperatividade-impulsividade, mas não deve ser interpretado como um instrumento de diagnóstico autónomo. Na prática clínica, a lista da CADDRA é utilizada sobretudo para apoiar a avaliação inicial e a documentação estruturada da PHDA em crianças, adolescentes e adultos.

Número de perguntas	18 perguntas
Duração estimada	10 minutos
Idioma	Português
Nome original	ADHD Assessment Checklist
Público-alvo	Crianças a adultos
Autores	Canadian ADHD Resource Alliance (2006)
Categoria	PHDA

Pré-visualização das 18 perguntas

Em que medida este sintoma está presente?

Não presta muita atenção aos pormenores, erros por descuido

Nada | Um pouco | Bastante | Muito

Em que medida este sintoma está presente?

Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas

Nada | Um pouco | Bastante | Muito

Em que medida este sintoma está presente?

Parece não ouvir quando lhe falam diretamente

Nada | Um pouco | Bastante | Muito

Em que medida este sintoma está presente?

Não segue instruções e não termina o trabalho

Nada | Um pouco | Bastante | Muito

Em que medida este sintoma está presente?

Dificuldade em organizar tarefas e atividades

Nada | Um pouco | Bastante | Muito

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

Cotação e interpretação

A lista abrange os 18 sintomas principais da PHDA, geralmente cotados numa escala de frequência ou de gravidade. Na prática, as respostas que correspondem a uma presença frequente do sintoma são consideradas clinicamente significativas. A interpretação baseia-se no número de sintomas de desatenção e/ou de hiperatividade-impulsividade presentes, com um limiar habitual de 6 sintomas por domínio em crianças e adolescentes e de 5 sintomas por domínio a partir dos 17 anos. A interpretação deve ter igualmente em conta o prejuízo funcional, a presença de dificuldades em pelo menos dois contextos, a sua antiguidade ao longo do desenvolvimento e o diagnóstico diferencial. A lista, por si só, não é suficiente para estabelecer um diagnóstico.

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente | Ver todos os questionários

★★★★★

"A cotação automática poupa-me imenso tempo e os meus pacientes estão muito mais dispostos a preencher os questionários."

Samia T. - Psicóloga online