OII

Inventário de intrusões obsessivas (OII)

O OII avalia a frequência, o sofrimento e o controlo percebido dos pensamentos intrusivos obsessivos em adultos. Ajuda a apreciar o carácter intrusivo de determinados conteúdos mentais frequentemente encontrados na perturbação obsessivo-compulsiva (POC) e na população geral. O instrumento contém afirmações que abrangem diferentes temas de intrusões obsessivas. Pode ajudar a diferenciar as intrusões normais das patológicas.

Número de perguntas	52 perguntas
Duração estimada	15 minutos
Idioma	Português
Nome original	Obsessive Intrusions Inventory
Público-alvo	Adultos
Autores	Jane F. Purdon, Mark H. Clark (1993)
Categoria	POC

Pré-visualização das 52 perguntas

Indique com que frequência teve cada um dos seguintes pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos.

Conduzir o carro contra uma montra

0 - Nunca tive este pensamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Tenho este pensamento frequentemente durante o dia

Indique com que frequência teve cada um dos seguintes pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos.

Fazer o carro sair da estrada

0 - Nunca tive este pensamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Tenho este pensamento frequentemente durante o dia

Indique com que frequência teve cada um dos seguintes pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos.

Atropelar animais ou pessoas com o carro

0 - Nunca tive este pensamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Tenho este pensamento frequentemente durante o dia

Indique com que frequência teve cada um dos seguintes pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos.

Guinar para o meio do trânsito

0 - Nunca tive este pensamento	1	2	3	4	5	6 - Tenho este pensamento frequentemente durante o dia

Indique com que frequência teve cada um dos seguintes pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos.

Embater contra objetos

0 - Nunca tive este pensamento	1	2	3	4	5	6 - Tenho este pensamento frequentemente durante o dia

Cotação e interpretação

Cada pergunta é cotada numa escala de frequência (de nunca a muito frequentemente), de sofrimento percebido (de nenhum a extremo) e de dificuldade de controlo (de nenhuma a extrema). As pontuações são somadas para fornecer uma medida global da frequência e do impacto das intrusões obsessivas. Podem ser utilizados pontos de corte para identificar perfis clínicos.