

Escala das síndromes positiva e negativa (PANSS)

A PANSS é um instrumento de avaliação clínica utilizado para medir a gravidade dos sintomas positivos e negativos em pacientes com esquizofrenia. Inclui também uma avaliação dos sintomas gerais associados à perturbação. O clínico cota cada item numa escala de 1 a 7, com base numa entrevista clínica estruturada e na observação direta.

Número de perguntas	30 perguntas
Duração estimada	45 minutos
Idioma	Português
Nome original	Positive and Negative Syndrome Scale
Público-alvo	Adultos com esquizofrenia
Autores	Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein, Lewis A. Opler (1987)

Pré-visualização das 30 perguntas

P1. Delírios

1 - Ausente | 2 - Mínimo | 3 - Ligeiro | 4 - Moderado | 5 - Moderadamente grave | 6 - Grave | 7 - Extremo

P2. Desorganização conceptual

1 - Ausente | 2 - Mínimo | 3 - Ligeiro | 4 - Moderado | 5 - Moderadamente grave | 6 - Grave | 7 - Extremo

P3. Comportamento alucinatório

1 - Ausente | 2 - Mínimo | 3 - Ligeiro | 4 - Moderado | 5 - Moderadamente grave | 6 - Grave | 7 - Extremo

P4. Excitação

1 - Ausente | 2 - Mínimo | 3 - Ligeiro | 4 - Moderado | 5 - Moderadamente grave | 6 - Grave | 7 - Extremo

P5. Grandiosidade

1 - Ausente | 2 - Mínimo | 3 - Ligeiro | 4 - Moderado | 5 - Moderadamente grave | 6 - Grave | 7 - Extremo

Cotação e interpretação

Cada item é cotado de 1 (ausente) a 7 (extremo). Obtêm-se três subescalas (positiva, negativa, geral) somando as pontuações dos itens correspondentes. As pontuações totais permitem estimar a gravidade global, bem como o equilíbrio entre sintomas positivos e negativos.

Utilização

Este instrumento não está disponível no Mentaal. Para aceder a este questionário, consulte o site do distribuidor oficial, Mapi Research Trust, e submeta um pedido no ePROVIDE™

Aceder ao ePROVIDE™