

Lista de verificação da perturbação de stress pós-traumático, versão específica (PCL-S)

A PCL-S é utilizada no rastreio da perturbação de stress pós-traumático (PSPT). Foi criada em 1993 por Weathers F.W. et al., com base nos critérios de diagnóstico do DSM-IV. Deriva da PCL-C (versão civil) e da PCL-M (versão militar), mas centra-se num acontecimento específico.

Número de perguntas	17 perguntas
Duração estimada	4 minutos
Idioma	Português
Nome original	Posttraumatic Checklist Scale
Categoria	PSPT

Pré-visualização das 17 perguntas

Memórias, pensamentos ou imagens repetidos e perturbadores da experiência stressante?

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Sonhos repetidos e perturbadores com a experiência stressante?

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Agir ou sentir de repente como se a experiência stressante estivesse a acontecer outra vez (como se a estivesse a reviver)?

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Sentir-se muito perturbado/a quando algo lhe recordou a experiência stressante?

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Ter reações físicas (por exemplo, coração a bater com força, dificuldade em respirar ou suores) quando algo lhe recordou a experiência stressante?

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente | Ver todos os questionários

★★★★★

"A cotação automática poupa-me imenso tempo e os meus pacientes estão muito mais dispostos a preencher os questionários."

Samia T. - Psicóloga online