

Självskattning av svårigheter med social kognition (ACSo)

ACSo är ett kort självskattningsformulär om social kognition som identifierar subjektiva besvär i vardagen. Det kartlägger fyra områden som är kliniskt användbara inom psykologi och psykiatri: attributionsbias, social perception och kunskap, känslomässiga processer och mentaliseringsförmåga. Det har utvecklats på franska ur ett transdiagnostiskt perspektiv och används främst till vuxna med psykiatriska tillstånd eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med sociokognitiv påverkan, framför allt schizofreni, bipolär sjukdom eller autismspektrumtillstånd. Det största värdet är att det kompletterar den objektiva bedömningen med ett mått på patientens subjektiva upplevelse, vilket är användbart för att förbereda psykosocial rehabilitering, rikta terapeutiska mål och följa förändringar i upplevda svårigheter.

Antal frågor	12 frågor
Beräknad tid	5 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Self-Assessment of Social Cognition Impairments
Målgrupp	Vuxna
Författare	Jérôme Graux, Alix Thillay, Vivien Morlec, Pierre-Yves Sarron, Sylvie Roux, Baptiste Gaudelus, Zelda Prost, Lindsay Brénugat-Herné, Isabelle Amado, Shasha Morel-Kohlmeyer, Emmanuelle Houy-Durand, Nicolas Franck, Isabelle Carteau-Martin, Charlotte Danset-Alexandre, Elodie Peyroux (2019)
Kategori	Autism

Förhandsgranskning av de 12 frågorna

Jag har svårt att känna igen andra människors känslor (ilska, rädsla, sorg ...).

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 | 4 - Mycket ofta

Jag har svårt att förstå sådant som inte är bokstavligt menat (till exempel ett skämt).

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 | 4 - Mycket ofta

Jag har svårt att bedöma om något är artigt eller oartigt.

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 | 4 - Mycket ofta

Jag tenderar att tro att människor gör saker med flit för att skada mig eller att de är fientliga mot mig.

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 | 4 - Mycket ofta

Jag saknar takt i kontakten med andra (till exempel kan jag, när jag säger vad jag tycker, oavsiktligt såra människor omkring mig).

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 | 4 - Mycket ofta

Poängsättning och tolkning

Varje påstående poängsätts från 0 till 4, från aldrig till väldigt ofta. Totalpoängen är summan av de 12 påståendena, med ett intervall från 0 till 48. En högre poäng tyder på mer subjektiva besvär med social kognition. Delskalepoäng kan beräknas enligt den validerade faktorlösningen: attributionsbias för påstående 4, 7 och 12; social perception och kunskap för påstående 3, 8 och 9; känslomässiga processer för påstående 1 och 10; mentaliseringsförmåga för påstående 2, 6 och 11. Påstående 5 räknas med i totalpoängen men ingår inte i delskalepoängen. I den ursprungliga studien gav ett gränsvärde på 13 god åtskillnad mellan patienter och kontroller, men det ska inte tolkas som ett diagnostiskt gränsvärde.

Användning

Det här instrumentet finns inte på Mentaal. För att kunna använda formuläret i ditt arbete behöver du en giltig licens. Vi rekommenderar att du skickar det direkt från utgivarens webbplats.

Gå till utgivarens webbplats