# Skattningsskala för ADHD, förskoleversion (ADHD-RS-IV-P)




ADHD Rating Scale-IV Preschool Version är en observatörsskattad skala för screening och kvantifiering av ADHD-symtom hos förskolebarn, vanligtvis mellan 3 och 5 år. Den omfattar de 18 symtomen i DSM-IV, formulerade med exempel som passar bättre för små barns vardagliga fungerande, för att öka den kliniska relevansen i observationerna från föräldrar och pedagoger. Instrumentet ger separata skattningar av ouppmärksamhet och hyperaktivitet—impulsivitet samt en total svårighetspoäng. Det är användbart i öppenvård, barnpsykiatri, utvecklingspsykologi och uppföljning av insatser, särskilt för att jämföra hur symtomen visar sig i olika miljöer. De största fördelarna är att det är enkelt att administrera, har god acceptans och att det finns standardiseringsdata för förskoleåldern. Det är ett screeninginstrument och ett stöd för den kliniska bedömningen och räcker inte ensamt för att ställa en diagnos.

| | |
|---|---|
| Antal frågor | 18 frågor |
| Beräknad tid | 10 minuter |
| Språk | Svenska |
| Originalnamn | ADHD Rating Scale-IV Preschool Version |
| Målgrupp | Förskolebarn |
| Författare | Kara E. McGoey, George J. DuPaul, Erin Haley, Teri L. Shelton (2007) |
| Kategori | ADHD, Barn |

**Låt dina patienter fylla i formulären online**

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

## Poängsättning och tolkning

Varje påstående poängsätts från 0 till 3 efter hur ofta beteendet har observerats under de senaste 6 månaderna. Påståenden med udda nummer bildar poängen för ouppmärksamhet och påståenden med jämna nummer poängen för hyperaktivitet—impulsivitet. Totalpoängen är summan av de 18 påståendena, och högre delskalepoäng och totalpoäng

tyder på mer uttalade symtom. I praktiken anses svaren 2 eller 3 ofta vara kliniskt positiva vid symtomscreening. Råpoäng kan omvandlas till T-poäng och percentiler utifrån typ av uppgiftslämnare och barnets kön när dessa tabeller finns tillgängliga. Poäng över den 93:e percentilen anses tala för klinisk risk men har inget diagnostiskt värde i sig. Tolkningen bör alltid stämmas av mot den kliniska intervjun, funktionsnedsättningen och observationer i flera miljöer.


## Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

 Sara A. - Psykolog online