ASBPD

Ardouins beteendeskala vid Parkinsons sjukdom (ASBPD)

ASBPD är en standardiserad klinisk intervju med fokus på stämnings-, motivations- och beteendestörningar vid Parkinsons sjukdom. Den hjälper till att identifiera och följa hypodopaminerga och hyperdopaminerga uttryck, icke-motoriska fluktuationer och flera impulsiva eller beroenderelaterade beteenden kopplade till sjukdomen eller dess behandling. Instrumentet är särskilt användbart inom neuropsykologi och multidisciplinär praktik för att objektivt identifiera symtom som ofta inte rapporteras spontant, fördjupa bedömningen före en behandlingsjustering och dokumentera förändringar under uppföljningens gång.

Antal frågor	21 frågor
Beräknad tid	60 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease
Målgrupp	Vuxna med Parkinsons sjukdom
Författare	Claire Ardouin, Isabelle Chéreau, Pierre-Michel Llorca, Estelle Lhommée, Franck Durif, Pierre Pollak, Paul Krack (2009)

Förhandsgranskning av de 21 frågorna

Under den senaste månaden, jämfört med patientens vanliga tillstånd:

Nedstämdhet

0 - Ingen förändring | 1 - Lätt | 2 - Måttlig | 3 - Uttalad | 4 - Allvarlig

Under den senaste månaden, jämfört med patientens vanliga tillstånd:

Hypoman eller manisk sinnesstämning

0 - Ingen förändring | 1 - Lätt | 2 - Måttlig | 3 - Uttalad | 4 - Allvarlig

Under den senaste månaden, jämfört med patientens vanliga tillstånd:

Ångest

0 - Ingen förändring | 1 - Lätt | 2 - Måttlig | 3 - Uttalad | 4 - Allvarlig

Under den senaste månaden, jämfört med patientens vanliga tillstånd:

Irritabilitet, aggressivitet

0 - Ingen förändring | 1 - Lätt | 2 - Måttlig | 3 - Uttalad | 4 - Allvarlig

Under den senaste månaden, jämfört med patientens vanliga tillstånd:

Hyperemotionalitet

0 - Ingen förändring | 1 - Lätt | 2 - Måttlig | 3 - Uttalad | 4 - Allvarlig

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Intervjun kartlägger symtom under den senaste månaden. Varje punkt skattas från 0 till 4 efter intensitet och frekvens, från ingen kliniskt märkbar förändring till allvarligt uttryck. Tolkningen bygger främst på profilen punkt för punkt och på de tematiska delskalepoängen snarare än på ett enskilt globalt gränsvärde. I praktiken är en punktpoäng på 2 eller högre en klinisk varningssignal och talar för en betydande beteendeförändring, som bör diskuteras i det neurologiska, psykiatriska och terapeutiska sammanhanget.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Mentaal har verkligen förenklat mitt arbete online tack vare den automatiska poängsättningen och det smidiga utskicket av formulär.”

Basile R. - Klinisk psykolog