
Kort skala för negativa symtom (BNSS)



BNSS är en kort klinikerskattad skala, administrerad som semistrukturerad intervju, som bedömer negativa symtom vid schizofreni och schizoaffektiva syndrom. Den kartlägger de fem områden som i dag anses centrala för denna symtombild, nämligen anhedoni, asocialitet, avolition, avtrubbad affekt och alogi, med en ytterligare fråga om bristande normalt lidande. Instrumentet utformades för att bättre stämma överens med nutida uppfattningar om negativa symtom än äldre skalor, och samtidigt vara tillräckligt kort för klinisk praktik och forskning. Det är särskilt användbart för att objektivt mäta den övergripande svårighetsgraden, skilja dimensionerna motivation—njutning och känslouttryck åt, följa förändringar under behandling och dokumentera en patients symtomprofil i detalj.

Antal frågor	13 frågor
Beräknad tid	12 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Brief Negative Symptom Scale
Målgrupp	Vuxna
Författare	Brian Kirkpatrick, Gregory P. Strauss, Linh Nguyen, Bernard A. Fischer, David G. Daniel, Angel Cienfuegos, Stephen R. Marder (2010)
Kategori	Psykossyndrom

Förhandsgranskning av de 13 frågorna

Intensitet i upplevd njutning under aktiviteter

Delskala: anhedoni

0 - Inget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Allvarligt

Frekvens av njutning under aktiviteter

Delskala: anhedoni

0 - Inget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Allvarligt

Intensitet i förväntad njutning inför framtida aktiviteter

Delskala: anhedoni

0 - Inget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Allvarligt

Lidande

Delskala: lidande (avsaknad av normalt lidande)

0 - Inget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Allvarligt

Asocialitet: beteende

Delskala: asocialitet

0 - Inget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Allvarligt

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje punkt skattas från 0 till 6 utifrån intervjun, observerat beteende och information som främst gäller de senaste 7 dagarna. Totalpoängen är summan av de 13 punkterna och ligger mellan 0 och 78. Delskalepoäng kan beräknas för anhedoni, asocialitet, avolition, avtrubbad affekt, alogi och bristande lidande. En högre poäng tyder på en allvarligare negativ symtombild. Punkten om lidande tolkas som en minskning av normalt lidande. Det finns inget allmänt accepterat diagnostiskt gränsvärde, så tolkningen bygger på den övergripande svårighetsgraden, profilen över delområdena och det kliniska sammanhanget.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Tillförlitliga och relevanta bedömningar som ger mig en bättre bild av mina patienters psykiska tillstånd”



Benjamin G. - Arbetspsykolog