CABI

Inventorium över barns och ungdomars beteende (CABI)

CABI är ett observatörsskattat formulär som fylls i av föräldrar för att identifiera och kvantifiera ett brett spektrum av känslomässiga, beteendemässiga och funktionella svårigheter hos barn och ungdomar. Föräldraversionen 2.0 omfattar 11 områden som kan användas tillsammans eller var för sig: trögt kognitivt tempo, ångest, depression, ouppmärksamhet, hyperaktivitet—impulsivitet, trotssyndrom, begränsade prosociala känslor, social funktionsnedsättning, avvisande från jämnåriga, socialt tillbakadragande och nedsatt skolfunktion. Det modulära formatet, de tydliga svarsförankringarna och den korta administreringstiden gör det till ett användbart instrument för klinisk screening, inledande bedömning och uppföljning av utvecklingen.

Antal frågor	79 frågor
Beräknad tid	10 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Child and Adolescent Behavior Inventory
Målgrupp	Föräldrar till barn/ungdomar
Författare	G. Leonard Burns, SoYean Lee, Mateu Servera, Keith McBurnett, Stephen P. Becker (2012)
Kategori	Ungdomar, Barn

Förhandsgranskning av de 79 frågorna

Ange hur ofta barnet har visat varje beteende under den senaste månaden.

Beteendet är långsamt (trögt)

Nästan aldrig (aldrig eller ungefär en gång per månad) | Sällan (ungefär en gång per vecka) | Ibland (flera gånger per vecka) | Ofta (ungefär en gång per dag) | Mycket ofta (flera gånger per dag) | Nästan alltid (många gånger per dag)

Ange hur ofta barnet har visat varje beteende under den senaste månaden.

Verkar befinna sig i en dimma

Nästan aldrig (aldrig eller ungefär en gång per månad) | Sällan (ungefär en gång per vecka) | Ibland (flera gånger per vecka) | Ofta (ungefär en gång per dag) | Mycket ofta (flera gånger per dag) | Nästan alltid (många gånger per dag)

Ange hur ofta barnet har visat varje beteende under den senaste månaden.

Stirrar tomt ut i luften

Nästan aldrig (aldrig eller ungefär en gång per månad) | Sällan (ungefär en gång per vecka) | Ibland (flera gånger per vecka) | Ofta (ungefär en gång per dag) | Mycket ofta (flera gånger per dag) | Nästan alltid (många gånger per dag)

Ange hur ofta barnet har visat varje beteende under den senaste månaden.

Dåsig eller sömnig (gäspar) under dagen

Nästan aldrig (aldrig eller ungefär en gång per månad) | Sällan (ungefär en gång per vecka) | Ibland (flera gånger per vecka) | Ofta (ungefär en gång per dag) | Mycket ofta (flera gånger per dag) | Nästan alltid (många gånger per dag)

Ange hur ofta barnet har visat varje beteende under den senaste månaden.

Dagdrömmer

Nästan aldrig (aldrig eller ungefär en gång per månad) | Sällan (ungefär en gång per vecka) | Ibland (flera gånger per vecka) | Ofta (ungefär en gång per dag) | Mycket ofta (flera gånger per dag) | Nästan alltid (många gånger per dag)

Poängsättning och tolkning

Poängsätt varje påstående enligt förankringen i formuläret. Del 1 till 7 poängsätts från 0 till 5. Del 8 till 11 poängsätts från 0 till 4. Beräkna helst en medelpoäng för varje delskala genom att dividera summan av poängen med antalet besvarade påståenden, vilket gör det lättare att jämföra områden av olika längd. Högre poäng tyder på större svårigheter för alla delskalor utom del 7 om begränsade prosociala känslor, vars påståenden beskriver prosociala beteenden och därför måste poängsättas omvänt för att ge en svårighetspoäng. Tolkningen görs delskala för delskala med hänsyn till det kliniska sammanhanget, korsvisa observationer och, om sådana finns, ålders- och könsnormer. Formuläret är avsett för screening och uppföljning, inte för att ensamt ställa en diagnos.