

Bedömning av posttraumatisk stress hos barn (CRIES-13)

CRIES är ett formulär avsett att bedöma hur traumatiska händelser påverkar barn. Det är utformat för att mäta symtom på undvikande, påträngande minnen och hyperaktivering efter en traumatisk händelse.

Antal frågor	13 frågor
Beräknad tid	3 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Child Revised Impact of Events Scale
Målgrupp	Barn i åldern 8 till 18 år
Författare	Patrick Smith, William Yule, S. N. Perrin (1998)
Kategori	PTSD, Barn

Förhandsgranskning av de 13 frågorna

Under de senaste 7 dagarna,

Tänkte du tillbaka på händelsen även när du inte ville det?

Inte alls | Sällan | Ibland | Mycket ofta

Under de senaste 7 dagarna,

Försökte du skjuta bort händelsen ur minnet?

Inte alls | Sällan | Ibland | Mycket ofta

Under de senaste 7 dagarna,

Hade du svårt att vara uppmärksam eller koncentrera dig?

Inte alls | Sällan | Ibland | Mycket ofta

Under de senaste 7 dagarna,

Fick du plötsliga vågor av starka känslor om det som hänt?

Inte alls | Sällan | Ibland | Mycket ofta

Under de senaste 7 dagarna,

Kände du dig mer rädd eller nervös än före händelsen?

Inte alls | Sällan | Ibland | Mycket ofta

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

CRIES-13 omfattar 13 frågor fördelade på tre delskalor: påträngande minnen (frågorna 1, 3, 6, 9), undvikande (frågorna 5, 7, 8, 10) och aktivering (frågorna 2, 4, 11, 12, 13). Varje fråga skattas på en 4-gradig Likertskala: 0 = Inte alls, 1 = Sällan, 3 = Ibland, 5 = Ofta. Mellanvärdena (2 och 4) används inte.

Totalpoängen fås genom att summera poängen på alla 13 frågor. Den varierar från 0 till 65. En totalpoäng på 30 eller högre anses tyda på hög risk för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det finns inget kliniskt gränsvärde för delskalorna.

Resultaten på CRIES-13 bör tolkas som en del av en heltäckande klinisk bedömning som tar hänsyn till den unga personens sammanhang, historia, skyddsfaktorer och tillgängliga stödresurser. Verktyget kan inte ensamt ligga till grund för en PTSD-diagnos. Varje diagnostisk bekräftelse måste göras av en professionell med lämplig utbildning i denna typ av bedömning.

CRIES-13 bedömer inte vissa PTSD-kriterier som infördes i DSM-5, särskilt negativa förändringar i kognitioner och sinnesstämning. Det rekommenderas därför att komplettera bedömningen med frågor som utforskar dessa dimensioner.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

Sara A. - Psykolog online