

Skala för manifest aggression (OAS)

OAS är en klinisk observationsskala som används för att objektivt bedöma manifest aggressivt beteende hos vuxna och barn, särskilt inom psykiatrisk slutenvård eller på institution. Den mäter fyra dimensioner av aggression: verbal aggression, fysisk aggression mot föremål, fysisk aggression mot sig själv och fysisk aggression mot andra personer. Med instrumentet går det att dokumentera varje aggressiv episod utifrån allvarlighetsgrad och de åtgärder som teamet har vidtagit. Det är särskilt användbart för longitudinell uppföljning, riskbedömning, analys av behandlingssvar och standardisering av observationer i både klinisk praktik och forskning.

Antal frågor	16 frågor
Beräknad tid	5 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Overt Aggression Scale
Målgrupp	Vuxna och barn
Författare	Stuart C. Yudofsky, Jonathan M. Silver, W. Jackson, Jean Endicott, Daniel Williams (1986)
Kategori	Förstämningssyndrom, Personlighetssyndrom

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

För varje aggressiv episod identifieras det allvarligaste observerade beteendet och motsvarande poäng ges inom en av de fyra kategorierna: 1 till 4 för verbal aggression, 5 till 8 för aggression mot föremål, 9 till 12 för aggression mot sig själv och 13 till 16 för aggression mot andra personer. Klinikern kan sedan notera högsta poäng, summan av episoderna och deras frekvens samt de åtgärder som vidtagits. Högre poäng speglar allvarligare aggression. Tolkningen bygger på det kliniska sammanhanget och förändringar över tid. Det finns inget universellt diagnostiskt gränsvärde.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Det är ett verkligt plus vid besöken för att bedöma patienten, och ett mycket rikt underlag för att fördjupa det kliniska samtalet.”

Elodie C. - KBT-psykolog