

Bedömning av posttraumatiskt stressyndrom (PCL-S)

PCL-S används för att screena för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det skapades 1993 av Weathers F.W. et al., utifrån de diagnostiska kriterierna i DSM-IV. Det härstammar från PCL-C (civil version) och PCL-M (militär version), men fokuserar på en specifik händelse.

Antal frågor	17 frågor
Beräknad tid	4 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Posttraumatic Checklist Scale
Kategori	PTSD

Förhandsgranskning av de 17 frågorna

Upprepade, störande minnen, tankar eller bilder av den stressfyllda erfarenheten?

Inte alls | Lite grann | Måttligt | Ganska mycket | Extremt

Upprepade, störande drömmar om den stressfyllda erfarenheten?

Inte alls | Lite grann | Måttligt | Ganska mycket | Extremt

Plötsligt agera eller känna som om den stressfyllda erfarenheten hände igen (som om du återupplevde den)?

Inte alls | Lite grann | Måttligt | Ganska mycket | Extremt

Känna dig mycket upprörd när något påminde dig om den stressfyllda erfarenheten?

Inte alls | Lite grann | Måttligt | Ganska mycket | Extremt

Ha fysiska reaktioner (till exempel bultande hjärta, andningssvårigheter eller svettning) när något påminde dig om den stressfyllda erfarenheten?

Inte alls | Lite grann | Måttligt | Ganska mycket | Extremt

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

Sara A. - Psykolog online