


Strukturerad klinisk intervju för dissociativa syndrom enligt DSM (SCID-D)

SCID-D är en semistrukturerad klinisk intervju för att bedöma förekomst och svårighetsgrad av dissociativa syndrom enligt DSM-kriterierna. Den används för att identifiera olika aspekter av dissociation, däribland amnesi, depersonalisation, derealisation, förvirring och dissociativ identitet, vilket underlättar differentialdiagnostik gentemot andra psykiska störningar.

Antal frågor	276 frågor
Beräknad tid	90 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders
Målgrupp	Vuxna, ungdomar
Författare	Marlene Steinberg (1994)
Kategori	Dissociativa syndrom

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Intervjun gör det möjligt att skatta varje symtom efter frekvens och svårighetsgrad. Bedömningen görs med hjälp av en särskild guide: varje dissociativt område analyseras för sig och integreras sedan i en samlad diagnostisk bedömning enligt DSM-kriterierna.

Användning

Det här instrumentet finns inte på Mentaal. För att kunna använda formuläret i ditt arbete behöver du en giltig licens. Vi rekommenderar att du skickar det direkt från utgivarens webbplats.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Det är ett verkligt plus vid besöken för att bedöma patienten, och ett mycket rikt underlag för att fördjupa det kliniska samtalet.”

Elodie C. - KBT-psykolog