TSC-40

Checklista för traumasymtom (TSC-40)

Trauma Symptom Checklist-40 är ett självskattningsformulär med 40 påståenden för vuxna. Det används för att identifiera intensiteten i symtom som ofta är förknippade med trauma under barndomen eller i vuxen ålder. Det kartlägger sex kliniska områden: ångest, depression, dissociation, index för trauma efter sexuella övergrepp, sexuella problem och sömnstörningar. Det används främst i forskning och som kompletterande mått i klinisk bedömning, ger en totalpoäng för traumarelaterat lidande och utgör inte i sig ett fullständigt diagnostiskt instrument för PTSD.

Antal frågor	40 frågor
Beräknad tid	12 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Trauma Symptom Checklist
Målgrupp	Vuxna
Författare	John Briere, Marsha Runtz (1992)
Kategori	PTSD

Förhandsgranskning av de 40 frågorna

Hur ofta har du upplevt följande under den senaste månaden?

Huvudvärk

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 - Ofta

Hur ofta har du upplevt följande under den senaste månaden?

Sömnlöshet

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 - Ofta

Hur ofta har du upplevt följande under den senaste månaden?

Viktnedgång (utan att banta)

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 - Ofta

Hur ofta har du upplevt följande under den senaste månaden?

Magbesvär

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 - Ofta

Hur ofta har du upplevt följande under den senaste månaden?

Sexuella problem

0 - Aldrig | 1 | 2 | 3 - Ofta

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje påstående skattas från 0 till 3 efter symtomets frekvens. Totalpoängen är summan av de 40 påståendena, med ett intervall från 0 till 120. Delskalorna beräknas genom att följande påståenden summeras: dissociation 7, 14, 16, 25, 31, 38; ångest 1, 4, 10, 16, 21, 27, 32, 34, 39; depression 2, 3, 9, 15, 19, 20, 26, 33, 37; SATI 5, 7, 13, 21, 25, 29, 31; sömnstörningar 2, 8, 13, 19, 22, 28; sexuella problem 5, 9, 11, 17, 23, 29, 35, 40. Högre poäng tyder på mer uttalade traumasymtom. Tolkningen är dimensionell och fokuserar på totalpoängen, delskaleprofilen och det kliniska sammanhanget. Det finns inget universellt fastställt kliniskt diagnostiskt gränsvärde.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Numera använder jag plattformen varje dag: den är heltäckande, tillförlitlig och mycket enkel att använda.”

Julie V. - Psykolog online