

Vanderbilts diagnostiska skattningsskala för ADHD (VADRS)

Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale (VADRS) är ett strukturerat formulär som främst används i skolmiljö och kliniska sammanhang för att bedöma förekomst av ADHD-symtom hos barn och ungdomar enligt DSM-kriterier. Det kan även screena för andra samtidiga störningar (trotsbeteende, ångest, depression). Det finns en föräldraversion och en lärarversion.

Antal frågor	55 frågor
Beräknad tid	10 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale
Målgrupp	Barn, ungdomar
Författare	Mark L. Wolraich, et al. (1998)
Kategori	ADHD, Barn

Förhandsgranskning av de 55 frågorna

Är inte uppmärksam på detaljer eller gör slarvfel, till exempel i läxorna

Aldrig | Ibland | Ofta | Mycket ofta

Har svårt att vara uppmärksam på det som behöver göras

Aldrig | Ibland | Ofta | Mycket ofta

Verkar inte lyssna när någon talar direkt till barnet

Aldrig | Ibland | Ofta | Mycket ofta

Följer inte instruktioner och slutför inte uppgifter

Aldrig | Ibland | Ofta | Mycket ofta

Har svårt att organisera uppgifter och aktiviteter

Aldrig | Ibland | Ofta | Mycket ofta

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje fråga poängsätts från 0 (aldrig) till 3 (mycket ofta). Ett cut-off-värde fastställs för varje delskala (ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet, uppförandestörning). Tolkningen bygger på antalet symtom som når den lägsta krävda frekvensen, i enlighet med DSM-5-kriterierna.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Mentaal har blivit en oumbärlig hjälp för att strukturera mina bedömningar och fördjupa den kliniska förståelsen av mina patienter.”

Nolwenn P. - KBT-psykolog